

【膵癌・胆道・胆管癌】

最終更新

2020年3月

| レジメン | 薬剤名 | 用量 | 用法 | | 1コース |
|----------------|---------|--------------------------|------|-----------|------|
| | | | 経路 | 投与日 | |
| GEM標準 | GEM | 1000mg/m ² | 点滴静注 | day1,8,15 | 28日 |
| GEM(2投1休) | GEM | 1000mg/m ² | 点滴静注 | day1,8 | 21日 |
| GEM(隔週) | GEM | 1000mg/m ² | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| TS-1+GEM(1投1休) | TS-1 | 65mg/m ² /day | 経口 | day1-7 | 14日 |
| | GEM | 1000mg/m ² | 点滴静注 | day8 | |
| TS-1+GEM(2投1休) | TS-1 | 60mg/m ² /day | 経口 | day1-14 | 21日 |
| | GEM | 1000mg/m ² | 点滴静注 | day1,8 | |
| GEM+CDDP | GEM | 1000mg/m ² | 点滴静注 | day1,8 | 21日 |
| | CDDP | 25mg/m ² | 点滴静注 | day1 | |
| FOLFIRINOX | I-LV | 200mg/m ² | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| | 5-FU | 400mg/m ² | 急速静注 | day1 | |
| | 5-FU | 2400mg/m ² | 点滴静注 | day1-3 | |
| | CPT-11 | 180mg/m ² | 点滴静注 | day1 | |
| | L-OHP | 85mg/m ² | 点滴静注 | day1 | |
| nab-PTX+GEM | nab-PTX | 125mg/m ² | 点滴静注 | day1,8,15 | 28日 |
| | GEM | 1000mg/m ² | 点滴静注 | day1,8,15 | |
| GEM+CDDP | GEM | 1000mg/m ² | 点滴静注 | day1 | 14日 |
| | CDDP | 35mg/m ² | 点滴静注 | day1 | |