

【直腸・結腸癌】

最終更新

2020年3月

レジメン	薬剤名	用量	用法		1コース
			経路	投与日	
RPMI	I-LV	250mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36	56日
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36	
LV5-FU2	I-LV	100mg/m ²	点滴静注	day1,2	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1,2	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,2	
LV5FU2+B-mab	I-LV	100mg/m ²	点滴静注	day1,2	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1,2	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,2	
	BV	5mg/kg	点滴静注	day1	
LV5FU2+C-mab (初回)	I-LV	100mg/m ²	点滴静注	day1,2	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1,2	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,2	
	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	150mg/m ²	点滴静注	day8	
LV5FU2+C-mab (2回目以降)	I-LV	100mg/m ²	点滴静注	day1,2	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1,2	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,2	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day1,8	
LV5FU2+P-mab	I-LV	100mg/m ²	点滴静注	day1,2	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1,2	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,2	
	Pmab	6mg/kg	点滴静注	day1	
sLV5FU2	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
sLV5FU2+B-mab	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	BV	5mg/kg	点滴静注	day1	

【直腸・結腸癌】

最終更新

2020年3月

sLV5FU2+C-mab (初回)	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day8	
sLV5FU2+C-mab (2回目以降)	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day1,8	
sLV5FU2+P-mab	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	Pmab	6mg/kg	点滴静注	day1	
FOLFOX4	I-LV	100mg/m ²	点滴静注	day1,2	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1,2	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,2	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
FOLFOX4+B-mab	I-LV	100mg/m ²	点滴静注	day1,2	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1,2	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,2	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	BV	5mg/kg	点滴静注	day1	
FOLFOX4+C-mab (初回)	I-LV	100mg/m ²	点滴静注	day1,2	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1,2	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,2	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day8	

【直腸・結腸癌】

最終更新

2020年3月

FOLFOX4+C-mab (2回以降)	I-LV	100mg/m ²	点滴静注	day1,2	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1,2	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,2	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day1,8	
FOLFOX4+P-mab	I-LV	100mg/m ²	点滴静注	day1,2	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1,2	
	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	day1,2	
	OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	Pmab	6mg/kg	点滴静注	day1	
mFOLFOX6	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
mFOLFOX6+B-mab	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	BV	5mg/kg	点滴静注	day1	
mFOLFOX6+C-mab (初回)	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day8	
mFOLFOX6+C-mab (2回以降)	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day1,8	

【直腸・結腸癌】

最終更新

2020年3月

mFOLFOX6+P-mab	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	Pmab	6mg/kg	点滴静注	day1	
FOLFIRI	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	
FOLFIRI+B-mab	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	
	BV	5mg/kg	点滴静注	day1	
FOLFIRI+C-mab (初回)	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day8	
FOLFIRI+C-mab (2回以降)	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day1,8	
FOLFIRI+Pani	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	
	Pmab	6mg/kg	点滴静注	day1	
XELOX	カペシタビン	2000mg/m ² /day	経口	day1~14	21日
	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	day1	

【直腸・結腸癌】

最終更新

2020年3月

XELOX+B-mab	カペシタビン	2000mg/m ² /day	経口	day1～14	21日
	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	day1	
	BV	5mg/kg	点滴静注	day1	
CPT-11+C-mab (初回)	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day8	
CPT-11+C-mab (2回目以降)	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day1,8	
CPT-11+P-mab	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	Pmab	6mg/kg	点滴静注	day1	
C-mab(初回)	Cmab	400mg/m ²	点滴静注	day1	7日
C-mab(2回以降)	Cmab	250mg/m ²	点滴静注	day1	7日
P-mab	Pmab	6mg/kg	点滴静注	day1	14日
SOX+B-mab	TS-1	80mg/m ² /day	経口	day1～14	21日
	L-OHP	130mg/m ²	点滴静注	day1	
	BV	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
sLV5FU2+C-mab (bi-weekly)	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	Cmab	500mg/m ²	点滴静注	day1	
mFOLFOX6+C-mab (bi-weekly)	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	500mg/m ²	点滴静注	day1	
FOLFIRI+C-mab (bi-weekly)	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	
	Cmab	500mg/m ²	点滴静注	day1	

【直腸・結腸癌】

最終更新

2020年3月

RAM+FOLFIRI	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	
	RAM	8mg/kg	点滴静注	day1	
FOLFIRI+ザルトラップ	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	
	AFL	4mg/kg	点滴静注	day1	
FOLFOXIRI	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	CPT-11	150mg/m ²	急速静注	day1	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	5-FU	3000mg/m ²	点滴静注	day1-3	
FOLFOXIRI+BV	I-LV	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	CPT-11	150mg/m ²	急速静注	day1	
	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	5-FU	3000mg/m ²	点滴静注	day1-3	
	BV	5mg/kg	点滴静注	day1	
SIRB	TS-1	80mg/m ² /day	経口	day1~14	21日
	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	day1	
	BV	7.5mg/kg	点滴静注	day1	